Andermatt Biogarten

Mode d'emploi pour

Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus low RH *

Acariens prédateurs contre acariens jaunes
Pour une lutte biologique des acariens jaunes sur les baies, les légumes et plantes d'ornement dans les serres.

Réception des phytoseiulus
Les acariens prédateurs (phytoseiulus) sont livrés soit sur un substrat soit sur des feuilles de haricots sèchées. Les auxiliaires devraient pouvoir être répartis dès leur réception. Il est possible de les stocker durant 1 à 2 jours à **5–8 °C**.

Utilisation
En cas d'infestation importante chez les plantes, traiter avant préalablement avec **Natural**. Les acariens prédateurs peuvent être introduits dès que la couche de bouillie de traitement est sèche.

1. Ne pas commencer le traitement lorsque le rayonnement solaire est fort.
2. Ouvrir l'emballage uniquement sur le lieu du lâcher.
3. Avant d'ouvrir, taper quelques coups sur couvercle et bien mélanger le substrat.
4. Répartir les acariens prédateurs principalement près des foyers. Eparpiller le substrat au-dessus des plantes à traiter. Si vous avez reçu des feuilles, couper les plus grandes feuilles et poser les sur les plantes.
5. Poser l'emballage vers les plantes pendant quelques jours afin de permettre à tous les phytoseiulus qui si trouvent d'en sortir.
6. Dans l'idéal, répéter le traitement avec les acariens prédateurs 2 à 4 fois dans un intervalle de 7 jours (selon infestation).
7. Les traitements chimiques sont à éviter durant l'intervention des auxiliaires

Recommandations importantes
- La température optimale pour le développement des phytoseiulus se situe entre 20 et 28 °C.
- Les phytoseiulus préfèrent un climat humide. Offrez leur des conditions optimales en pulvérisant les plantes avec un pulvérisateur (p.ex. **Foxy Plus**) plusieurs fois par jour.
- Un fort rayonnement solaire freine le développement des phytoseiulus. Ombrez les plantes traitées par temps chaud.

Informations sur les phytoseiulus
Les acariens prédateurs sont de couleur orange rouge brillant et se déplacent plus rapidement que les acariens jaunes. Dans des conditions optimales, les acariens prédateurs devraient être actifs 1 à 2 semaines après leur lâcher (rapport acarien prédateur à acarien jaune max. 1 : 10). Ce rapport ne devrait plus changer par la suite au bénéfice des acariens jaunes. Après 4 semaines, les plantes ne devraient plus avoir d'acariens jaunes.

Titulaire d'autorisation: Andermatt Biocontrol AG, 6146 Grossdietwil, Tel. 062 917 50 05.
Organismes vivants (acariens): XVIarves et adultes. Teneur: *Phytoseiulus persimilis*; No. de l'homologation: W 4710
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

* Phytoseiulus low RH, contrairement aux *Phytoseiulus persimilis*, sont capables de survivre à une humidité de l'air basse (moins de 50 %) et sont idéaux quand l'humidité de l'air ne peut être élevée.

08/11

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Tel. +41 (0)62 917 50 00, Fax +41 (0)62 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch

Andermatt Biogarten

Mode d'emploi pour

Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus low RH *

Acariens prédateurs contre acariens jaunes
Pour une lutte biologique des acariens jaunes sur les baies, les légumes et plantes d'ornement dans les serres.

Réception des phytoseiulus
Les acariens prédateurs (phytoseiulus) sont livrés soit sur un substrat soit sur des feuilles de haricots sèchées. Les auxiliaires devraient pouvoir être répartis dès leur réception. Il est possible de les stocker durant 1 à 2 jours à 5–8 °C.

Utilisation
En cas d'infestation importante chez les plantes, traiter avant préalablement avec Natural. Les acariens prédateurs peuvent être introduits dès que la couche de bouillie de traitement est sèche.

1. Ne pas commencer le traitement lorsque le rayonnement solaire est fort.
2. Ouvrir l'emballage uniquement sur le lieu du lâcher.
3. Avant d'ouvrir, taper quelques coups sur couvercle et bien mélanger le substrat.
4. Répartir les acariens prédateurs principalement près des foyers. Eparpiller le substrat au-dessus des plantes à traiter. Si vous avez reçu des feuilles, couper les plus grandes feuilles et poser les sur les plantes.
5. Poser l'emballage vers les plantes pendant quelques jours afin de permettre à tous les phytoseiulus qui si trouvent d'en sortir.
6. Dans l'idéal, répéter le traitement avec les acariens prédateurs 2 à 4 fois dans un intervalle de 7 jours (selon infestation).
7. Les traitements chimiques sont à éviter durant l'intervention des auxiliaires

Recommandations importantes
- La température optimale pour le développement des phytoseiulus se situe entre 20 et 28 °C.
- Les phytoseiulus préfèrent un climat humide. Offrez leur des conditions optimales en pulvérisant les plantes avec un pulvérisateur (p.ex. Foxy Plus) plusieurs fois par jour.
- Un fort rayonnement solaire freine le développement des phytoseiulus. Ombrez les plantes traitées par temps chaud.

Informations sur les phytoseiulus
Les acariens prédateurs sont de couleur orange rouge brillant et se déplacent plus rapidement que les acariens jaunes. Dans des conditions optimales, les acariens prédateurs devraient être actifs 1 à 2 semaines après leur lâcher (rapport acarien prédateur à acarien jaune max. 1 : 10). Ce rapport ne devrait plus changer par la suite au bénéfice des acariens jaunes. Après 4 semaines, les plantes ne devraient plus avoir d'acariens jaunes.

Titulaire d'autorisation: Andermatt Biocontrol AG, 6146 Grossdietwil, Tel. 062 917 50 05.
Organismes vivants (acariens): XVIarves et adultes. Teneur: *Phytoseiulus persimilis*; No. de l'homologation: W 4710
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

* Phytoseiulus low RH, contrairement aux *Phytoseiulus persimilis*, sont capables de survivre à une humidité de l'air basse (moins de 50 %) et sont idéaux quand l'humidité de l'air ne peut être élevée.

08/11

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Tel. +41 (0)62 917 50 00, Fax +41 (0)62 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch